Nouveaux Coléoptéres Malacodermes de l'Amérique Méridionale

PAR

M. Pic

Les Malacodermes décrits ici, à l'exception de deux espèces dont l'origine n'est pas précise, proviennent de la Republique Argentine; les types figurent au moins dans ma collection.

Leucothrix argentina n. sp. Elongata, parum nitida, pro parte griseo pubescens, nigra, thorace piceo, postice rufo tincto, testaceo marginato, pedibus pro parte et articulis 3 ultimis antennarum flavis; antennis sat brevibus, depressis, subfiliformibus; thorace sat breve et lato, antice arcuato, in disco parum et sparse punctato; elytris thorace non latioribus, fere parallelis, sparse rugulosis. Long. 5,5 mill. Haut-Paraná (Wagner, in coll. Pic).

Voisin de *L. macrescens* E. Ol., en diffère par les antennes subfiliformes, les élytres moins allongés et la coloration du prothorax.

Calopteron Wagneri n. sp. Oblongo-elongatum, paulo nitidum, nigrum, thorace, illo medio vage brunnescente, coxis, femoribus ad basin elytrisque medio testaceis, illis apice late et antice diverse nigris, costa humeralis testacea; antennis ad basin rufo notatis, depressis; thorace transverso, angulis posticis prominulis; elytris post humeros paulo dilatatis, costis alternis minoribus, intervallis irregulariter plicatis et unifenestratis. Long. 8 mill. Río Salado (Wagner, in coll. Pic).

Sans doute voisin de *E. nigripes* Tasch. dont il diffère au moins par les cuisses largement testacées.

Calopteron maculatum Tasch. (var.). La forme type a les élytres maculés de noir à la base, mais il existe des exemplaires qui en sont dépourvus, en ayant: soit seulement le sommet de ces organes largement noir (v. nov. **mediobliteratum**), soit, en plus, une petite macule foncée discale et prémédiane sur chacun (v. nov. **ignaciosum**).

Je possède cette espèce des chasses de Wagner, la forme type recueillie à: Río Salado, in Chaco de Santiago del Estero, les variétés à: San Ignacio, dans le Haut Paraná.

Chauliognathus bilineaticollis n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, testaceus, capite postice et antennis, illis ad basin rufis, nigris; thorace nigro sinuato-bilineato, angustato et elongato; elytris testaceis, paulo ad scutellum et ante apicem piceis, apice luteis, brevibus et dehiscentibus, mediocre sat dense, punctatis; abdomine prominulo; pedibus testaceis, pro parte brunneis aut piceo notatis. Variat: lineis thoracis pro parte junctis (var. **semicon-**

nexus). Long. 7-8 mill. République Argentine et Paraguay (coll. Pic). Voisin de *C. curtelineatus* Pic, élytres plus elargis aux épaules et moins longs avec la coloration differente.

Chauliognathus nigrolateralis n. sp. Paulo elongatus, fere opacus, capite membrisque pro majore parte nigris; thorace rufo, antice brunnescente, parum elongato, sulcato et impresso; elytris luteis, nigro marginatis, his apice attenuatis; infra corpore flavo, abdomine nigro notato; antennis gracilibus; pedibus elongatis. Long. 9 mill. Amérique Méridionale (coll. Pic). Peut se placer près de *C. corvinus* Gorh. plus étroit et de coloration tout autre.

Chauliognathus erratus n. sp. Elongatus, subparallelus, subnitidus, luteus, nigro notatus, thorace medio nigro-notato, maculam simulans, elytris ad basin reducte et post medium minute nigropiceo maculatis, membris nigris, femoribus ad basin late rufis; thorace subquadrato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, apice paulo attenuatis, sat dense granuloso punctatis, pedibus longissimis. Long. 12 mill. Amérique Méridionale (coll. Hicker et Pic).

A placer prés de *C. subapicalis* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres moins longs et maculés.

Discodon criollanum n. sp. Parum elongatum et robustum, subnitidum, nigrum, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his ad scutellum minute et apice late nigro notatis; antennis parum gracilibus; thorace robusto, lateraliter ad medium paulo inciso; elytris sat brevibus, minute et reducte costulatis. Long. 7-8 mill. La Criolla 1500 m. et Lagunita 3000 m. in Prov. Tucumán (Baer, in coll. Pic).

Espèce distincte entre toutes par sa forme robuste jointe à sa coloration.

A distinguer chez cette espèce, à titre de variétés, les dessins elytraux suivants: v. **medioiunctum** insectes ayant, en plus de la macule apicale noire, une bande suturale antérieure élargie en avant — v. **suturiferum**: insectes à élytres munis d'une bande suturale noire, dilatée postérieurement sans atteindre les côtés.

Discodon laticolle n. sp. Parum robustum, nigrum, antennis ad basin, capite antice late, thorace, scutello, geniculis aut tibiis ad basin rufis, elytris antice minute et abdomine pro parte testaceo marginatis; antennis parum crassis, sat brevibus; thorace breve et lato, marginato, lateraliter subarcuato; élytris thorace non latioribus, parum elongatis, dense ruguloso-punctatis, incostatis. Long. 7 mill. Rép. Argentine (coll. Pic).

A placer près de *D. cordubense* Berg, en diffère par le prothorax particulier, la tête brièvement noire postérieurement.

Silis vagelimbatus n. sp. ♂. Sat robustus, nitidus, testaceus, antennis, articulis primis exceptis, tarsis et infra corpore pro parte nigris, elytris in disco ad basin et ad apicem brunneo-fuscis; thorace sat robusto, supra postice inaequale, postice lateraliter spinoso, spinis, apice fissis. Long. 5 mill. Rép. Argentine (coll. Pic).

Voisin de *S. robusticollis* Pic, prothorax moins robuste à dent différente et coloration moins foncée.